

Farmacia Pedro del Río Pérez  
 C/ Mayor, 3  
 Quintana de Rueda  
 24930 León  
 Telf.: 987 337 151  
[pedrodelrio@uninet.edu](mailto:pedrodelrio@uninet.edu)  
[www.farmaciapedrodelrio.eu](http://www.farmaciapedrodelrio.eu)

### FÓRMULAS MAGISTRALES DE USO HABITUAL

PATOLOGÍA	NOMBRE DE LA FM	DOSIS
Antiséptico, desinfectante	Alcohol de 70°, csp. 100 mL	
Cortaduras tras el afeitado	Aluminio sulfato, 89% + Aluminio Potasio sulfato, 11%	
Dermatitis seborreica del cuero cabelludo	<p>Champú de Acido Salicílico, 2% + Bioazufre, 2'5% + Mentol 0'5%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Acido Salicílico 2% + Coaltar 5% + Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2% + Piritiona Olamina 2%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Bioazufre 2'5% + Mentol 0'5%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Bioazufre 3% + Tioxolona 0'5%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Coaltar 10% + Ketoconazol 2%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Ketoconazol 2% + Tioxolona 0'5%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Ketoconazol 2% + Zinc Piritiona 2%, csp. 250 mL</p> <p>.....</p> <p>Champú de Ketoconazol al 2%, csp. 250 mL</p>	2-4 veces/semana
Caspa acompañada de seborrea. Psoriasis del cuero cabelludo	Champú de Acido Salicílico 4%+ Coaltar 5% + Magnesio Piritiona 1'5%, csp. 250 mL	2-3 lavados/semana
Dermatitis seborreica. Hongos del cuero cabelludo	Champú de Acido Salicílico 2% + Ketoconazol 2%, csp. 250 mL	2-3 lavados/semana
Alopecia	Champú de Acido Salicílico 2% + Minoxidilo, 2%, csp. 250 mL	Lavar el pelo todos los días.

Verrugas	5-FU, 5% + Ácido Salicílico, 10% + Colodión elástico, csp. 10 gramos	1 aplic./12 h/10 días. Entre el 4º-10º día aparecerá una intensa reacción inflamatoria. Cuando ocurra, se interrumpirá la aplicación. La curación (destrucción de la lesión). tiene lugar aprox. a los 15 días de interrumpida la aplicación. No queda cicatriz.
Verrugas	Acido Láctico, 5 g + Acido Salicílico, 5 g + Resina de Podofilino, 5 g + Colodión elástico, 30 g	1 aplicación/día/10-15 días
Estomatitis aftosa	Colutorio de Tetraciclina*HCl, 5-10 MUI + Triamcinolona acetónido, 0'1 % + Glicerina, csp. 50 g	4-5 aplicaciones/día
Antiséptico bucal con úlceras dolorosas	Colutorio de Clorhexidina digluconato 0'2% + Lidocaína*HCl 2%, csp. 100 mL	2-4 enjuagues/día después de comidas
Mucositis: 2-4 enjuagues/día antes de comidas	Colutorio de Gentamicina*SO4 80mg+ Hidrocortisona 100mg+ Lidocaína*HCl 2%+ Nistatina 3.000.000 UI, csp. 100 mL	Mucositis: 2-4 enjuagues/día antes de comidas
Muguet, úlceras aftosas, estomatitis, antiséptico bucal	Colutorio de Bórax 2%+ Glicerina 10%+ Esencia de Menta 10 gotas+ Sodio bicarbonato 1%, csp. 100 mL	Gargarismos 2-3 vces al día
Antiséptico bucal	Colutorio de Bórax 3%+ Miel rosada 20%+ Potasio clorato 2% + Cocimiento de llantén, csp. 100 mL	1-4 aplicaciones/día
Aftas bucales	Colutorio de Fluocinolona acetónido 0'4%, csp. 100 mL	Usar después de cada comida (3-4 veces/día) durante 30-60 segundos
Mucositis post-radioterapia	Colutorio (gel bucal) de Aluminio Hidróxido 5%+ Difenhidramina*HCl 0'25%+ Lidocaína*HCl 2%, csp. 100 mL	2-4 enjuagues/día antes de comidas
Micosis oral	Gel bucal de Ketoconazol al 2%, csp. 100 mL Colutorio de Ketoconazol al 2%, csp. 100 mL	1-4 aplicaciones/día reteniendo el mayor tiempo posible el gel en la boca. Si hay afectación del esófago, se tragará el gel
Estomatitis, faringitis, halitosis, aftas bucales	Colutorio de Bórax 1%+ Esencia Salvia 0'05%+ Esencia Tomillo 0'05%+ Mentol 0'5%, csp. 100 mL	5-10 mL/50-250 mL de agua y hacer gárgaras.
Aftas bucales, estomatitis aftosa recurrente	Colutorio de Tetraciclina 2'5%, csp. 100 mL	Hacer enjuagues 1-3/día
Mucositis	Colutorio de Clorhexidina digluconato 0'12%+ Lidocaína*HCl 1%+ Nistatina 100.000 UI, csp. 100 mL	2-4 enjuagues/día antes de comidas

Aftas bucales	<p>Colutorio de Hidrocortisona base 1%+ Sucralfato 5%+ Tetraciclina 2%, csp. 100 mL</p> <p>.....</p> <p>Colutorio de Ácido Salicílico 0'5%+ Triamcinolona acetónido 0'05-0'1%, csp. 100 mL</p> <p>.....</p> <p>Colutorio de Triamcinolona acetónido 0'05-0'1%, csp. 100 mL</p> <p>.....</p> <p>Colutorio de Benzocaína 0'5-1'5%+ Tintura de Mira 25%+ Tintura de Ratania 25% + Agua purificada, csp. 100 mL</p>	Enjuagues bucales 1-4/día
Despigmentante cutáneo	Crema-gel de Ácido Kójico, 2% + Ácido Retinoico, 0'025% + Extrapón Aloe vera, 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Acné	<p>Crema-gel de Ácido Retinoico, 0'075% + Sulfacetamida*Na, 10% + Aloe vera, 10%, csp. 100 gramos</p> <p>.....</p> <p>Crema-gel de Ácido Retinoico, 0'100% + Aloe vera, 10% + Niacinamida, 4% + Zinc acetato, 1'2%, csp. 100 gramos</p>	1-2 aplicaciones/día
Dermatosis cutáneas que cursen con mucha sequedad de piel	Crema-gel de Amonio Lactato 12% + Clobetasol propionato 0'05%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Rosácea	Crema-gel de Metronidazol 1%, csp. 60 gramos	1-2 aplicaciones/día
Tratamiento paliativo de diversos tumores	Cápsulas de Dexametasona 4 mg – Para una cápsula N° 100	
Alopecia masculina	Cápsulas de Finasterida 1 mg – Para una cápsula N° 100	1 cp/día
Sarna costrosa	Cápsulas de Ivermectina, x mcg – Para una cápsula N° 100	200 µg/Kg de peso/día
Teniasis	Cápsulas de Niclosamida 500 mg – Para una cápsula N° x (donde x es 2 ó 3 cápsulas)	Hasta 34 kg --> 1 g/día. Más de 34 kg --> 1,5 g/día. Dosis única
Alcalinizante urinario para diversas patologías renales	Cápsulas de Sodio Bicarbonato 1 g – Para una cápsula N° 100	Según alcalinidad del paciente
Enfermedad de Wilson	Cápsulas de Zinc acetato, 50 mg – Para una cápsula N° 100	
Alopecia aretata. Acné	Cápsulas de Zinc gluconato 200 mg – Para una cápsula N° 100	200 mg/12 h/6 meses
- Calambres (en pacientes con patología hepática) - Verrugas	Cápsulas de Zinc (sulfato), 220 mg – Para una cápsula N° 100	- Patología hepática: 1 cp/12 horas - Verrugas: 10 mg/Kg/día (máximo 600 mg)
Queratosis solar y senil, enfermedad de Bowen, epiteloma maligno superficial (simple o múltiple)	Crema O/W de 5-Fluorouracilo al 5%, csp. 100 gramos	1 aplicación/día durante 3-4 semanas

Despigmentante cutáneo	Crema O/W de Ácido Azelaico 20% + Ácido Retinoico 0'025% + Clindamicina*HCl 1% + Hidroquinona 3% + Aloe vera 3%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
	..... Crema O/W de Ácido Kojico 3% + Hidroquinona 3%, csp. 100 gramos	
	..... Crema O/W de Hidroquinona 5% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos	
Inflamciones y dermatosis cutáneas	Crema O/W de Aceite de Caléndula 5%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Hidratante, pequeñas úlceras cutáneas, escoriaciones	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 0'5% + Exto. C. asiatica 10% + Urea 5%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día
Ezemas, úlceras	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 1% + Alantoína 0'5% + Hidrocortisona 2% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Cicatrizante (úlceras tópicas, irritación cutánea, quemaduras)	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Tánico 5%+ Exto. C. asiatica 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatitis cutáneas	Crema O/W de Aceite de Caléndula 5%+ Alantoína 0'5% + Clobetasol propionato, 0'05%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Cicatrización de heridas sobreinfectadas por gérmenes sensibles	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Cloranfenicol 1%+ Exto. C. asiatica 10%+ Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Cicatrizante (úlceras tópicas, irritación cutánea, quemaduras)	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Exto. C. asiatica 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Cicatrizante (úlceras cutáneas, quemaduras, heridas,...)	Crema O/W de Aceite de Caléndula 5% + Exto. C. asiatica 5% + Exto. Hipérico 5%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Traumatismos con hematoma (sin herida)	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Exto. C. asiatica 10% + Heparina*Na 1000 UI/gramo, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Cicatrizante (úlceras tópicas, quemaduras,...) en procesos infectados por anaerobios	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Exto. C. asiatica 10% + Metronidazol, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatitis	Crema O/W de Aceite de Caléndula 15 + Exto. Hipérico 5% + Hidrocortisona 1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Heridas sobreinfectadas por anaerobios	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10%+ Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Piel seca. Hidratante cutáneo	Crema O/W de Aceite de Caléndula 5% + Urea 5-10%, csp. 100 gramos	2-4 aplicaciones/día
	..... Emulsión O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10% + Urea 5-10%, csp. 100 gramos	
Cicatrices	Crema O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10-20%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día

Escaras, úlceras, quemaduras	Crema O/W de Aceite de Rosa Mosqueta 10% + Alantoína 0'5% + Exto. C. asiatica + Ictiol 1% + Zinc óxido 5%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Atopia corporal	Crema O/W de Ácido Fusídico 2% + Tracólimus 0'1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Xerosis. Ictiosis	Crema O/W de Acido Láctico 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos ..... Crema O/W de Lanolina 15% + Urea 10%, csp. 100 gramos	2-4 aplicaciones/día
Psoriasis	Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'1% + Betametasona dipropionato 0'5% + Urea 10%, csp. 100 gramos ..... Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025-0'15% + Triamcinolona acetónido, 0'1%, csp. 100 gramos ..... Crema O/W de Ácido Salicílico 0'4% + Ditranol (Antralina) 0'4%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día. Empezar con una aplicación al día por la noche y a medida que aumente la tolerancia se pasará a 1 aplicación cada 12 horas  1 aplicación por la noche antes de acostarse
Acné	Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025-0'15% + Eritromicina 2-3%, csp. 100 gramos	1 aplicación/día (por la noche). Se debe usar un protector solar de factor alto mientras dure el tratamiento
Hiperpigmentación de la piel	Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025%+ Hidroquinona 3%, csp. 100 gramos ..... Crema O/W de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'1% + Hidroquinona 10% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatitis, Ezcema...con hiperqueratosis	Crema O/W de Ácido Salicílico 2-5% + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Manos agrietadas	Crema O/W de Ácido Salicílico 2-4% + Aloe vera 10%, csp. 100 gramos	2-4 aplicaciones/día
Dermatitis atópica, de contacto, alérgica	Crema O/W de Ácido Salicílico 2% + Hidrocortisona 2%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día
Prurito, sequedad cutánea	Crema O/W de Ácido Salicílico 2-4% + Mentol 0'5% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Psoriasis en placas	Crema O/W de Ácido Salicílico 10% + Tracólimus 0'1-0'3%, csp. 100 gramos	
Piel seca con descamación e hiperqueratósica	Crema O/W de Ácido Salicílico 1-2% + Urea 5%, csp. 100 gramos	2-4 aplicaciones/día
Hiperqueratosis y sequedad cutánea	Crema O/W de Ácido Salicílico 3% + Amonio Lactato 12% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatosis cutáneas en las que se requiera hidratación	Crema O/W de Amonio Lactato 12% + Clobetasol propionato 0'05%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día

Hidrocistomas ecrinos múltiples para reducir la secreción de sudor de las glándulas sudoríparas	Crema O/W de Atropina sulfato al 1%, csp. 100 gramos	
Dermatitis atópica	Crema O/W de Cafeína anhidra 20% + Hidrocortisona 2-5%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Neuralgia post-herpética. Dolor asociado a artritis reumatoide y osteoartritis. Prurito modular refractario. Neuropatía diabética.	Crema O/W de Capsaicina al 0'025 - 0'2%, csp. 100 gramos	4-6 aplicaciones/día
Úlceras infectadas	Crema O/W de Clindamicina*HCl 1% + Gentamicina*SO4 0'1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Infecciones cutáneas por microorganismos sensibles al cloranfenicol	Crema O/W de Cloranfenicol 1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Intertrigo	Crema O/W de Clotrimazol 1% + Sodio Fusidato 2-4% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día
Dermatomicosis con componente inflamatorio y pruriginosas	Crema O/W de Clotrimazol 1% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Prurito	Crema O/W de Doxepina al 5%, csp. 100 gramos	2-4 veces al día (dejar pasar al menos 3 horas entre cada aplicación)
	Crema O/W de Mentol 0'5-1%, csp. 100 gramos	2-4 veces/día
Infecciones cutáneas con componente inflamatorio	Crema O/W de Eritromicina 2% + Hidrocortisona 1%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día
Sabañones	Crema O/W de Escina 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos	2 -3 aplicaciones/día
Cicatrización de heridas infectadas	Crema O/W de Exto. C. asiática 1-10% + Neomicina*SO4 0'35%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Herpes labial	Crema O/W de Exto. Equinácea 10% + Exto. Hipérico 10%, csp. 100 gramos	1-5 aplicaciones/día
Psoriasis, eczemas, dermatosis que cursen con sequedad de piel	Crema O/W de Halcinónida 0'2% + Urea 10-15%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Micosis cutánea con componente inflamatorio	Crema O/W de Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Rosacea seborreica	Crema O/W de Ictiol 1% + Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Dermatitis. Picaduras de insectos	Crema O/W de Hidrocortisona base 1-2%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Dermatitis seborreica	Crema O/W de Litio succinato 5 gramos, csp. 45 gramos	1 aplicación/12 horas

Rosácea eritematotelangiectásica	Crema O/W de Metronidazol 1%, csp. 100 gramos ..... Crema O/W de Metronidazol 1% + Tracólimus 0'03-0'05%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Vitíligo	Crema O/W de Monobencileterhidroquinona al 10%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas durante 1 año
Sarna	Crema O/W de Permetrina al 5%, csp. 100 gramos	1 sola aplicación en todo el cuerpo excepto en la cabeza previa ducha; se aplica por la noche antes de acostarse y se ducha a la mañana siguiente
Acné	Crema O/W de Peróxido de Benzoílo 5-10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Reabsorción de bultos de grasa en las mamas. Tensión premenstrual	Crema O/W de Progesterona 1-10%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Psoriasis. Eczema	Crema O/W de Tardoak 1%, csp. 100 g	1-3 aplicaciones/día
Psoriasis, dermatitis (alérgica, de contacto,...)	Crema O/W de Triamcinolona 0'1% + Urea 10% + Lanolina 6%, csp. 100 g ..... Crema O/W de Triamcinolona 0'1% + Urea 10%, csp. 100 g	1-2 aplicaciones/día
Hiperqueratosis plantar	Crema O/W de Urea al 25%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Omicogrifosis (uñas duras y muy grandes)	Crema O/W de Urea al 40%, csp. 100 g	1 aplicación nocturna en cura oclusiva
Hiperhidrosis	Crema O/W de Urotropina al 20%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Piel seca	Crema O/W de Vitamina A hidrosoluble 2% + Urea 10%, csp. 100 gramos	2-4 veces/día
Onicopatías (uñas frágiles, quebradizas, despegadas de la piel)	Crema O/W de Vitamina E acetato 5%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Ulceras de la piel, escoriaciones. Eczemas, intretigo	Crema O/W de Zinc óxido 5-10%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Hidratación de cutis normal	Crema de Aceite de Jojoba 1% + Colágeno soluble 5%, csp. 100 gramos	Aplicar tantas veces como se precise
Hidratación de manos	Crema de Aceite de Caléndula 2% + Vitamina F 1% + Urea 5%, csp. 100 g	Aplicar tantas veces como se precise
Vaginitis inespecíficas. Leocorrea con lesión en la pared vaginal	Crema O/W vaginal de Aceite de Caléndula 5% + Exto. C. asiatica 5%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Prurito genital	Crema O/W vaginal de Lidocaína*HCl, 2%, csp. 100 gramos	3-4 aplicaciones/día
Grietas dérmicas, ulceraciones	Crema O/W de Aceite de Caléndula 10% + Ácido Salicílico 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Psoriasis	Crema W/O de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'1% + Betametasona dipropionato 0'5%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día. Empezar con una aplicación al día por la noche y a medida que aumente la tolerancia se pasará a 1 aplicación cada 12 horas

Dermatitis. Manos agrietadas	Crema W/O de Ácido Salicílico 1-10% + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 5-10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Escaras infectadas, úlceras infectadas,...	Crema W/O de Ácido Tánico 10% + Cloranfenicol 1%, csp. 100 gramos ..... Crema W/O de Ácido Tánico 10% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día (en cada cura)
Dermatosis, psoriasis,..	Crema W/O de Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 10-15%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatosis, picaduras de insectos,...	Crema W/O de Triamcinolona acetónido al 0'1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatitis seborreica. Herpes genital recurrente	Crema W/S de Litio succinato 8% + Zinc sulfato 0'05%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Rosácea	Crema W/S de Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
- Aftas orales (alivio del dolor).  - Picores en la mucosa genital femenina externa	Gel acuoso de Lidocaína*HCl 1-2%, csp. 100 gramos	- Enjuagar la boca con 10 mL al menos 5-10 minutos antes de las comidas. Procurar no ingerir el líquido  - 1-3 aplic./día
Acné	Gel tópico (neutro) de Ácido Retinoico (Tretinoína), 0'025-0'15%, csp. 100 g	1-2 aplicaciones/día
Vitíligo	Gel tópico (neutro) de Kelina al 2% + Fenilalanina al 10%, csp. 100 gramos	Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA.
Dermatomicosis	Gel tópico (neutro) de Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Rosácea asociada a dermatitis seborreica	Gel tópico (neutro) de Ketoconazol 2% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Rosácea papulopustular	Gel tópico (neutro) de Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Pie de atleta	Gel tópico (neutro) de Miconazol*NO3 al 2%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Fisura anal	Gel tópico (neutro) de Nitroglicerina 0'2%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Rosácea	Gel tópico de Ácido Azelaico al 15%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas durante 1-2 meses (máximo 6 meses seguidos)
Acné	Gel tópico de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025% + Clindamicina 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Alopecia areata	Gel tópico de Ácido Retinoico (Tretinoína) 0'025-0'5% + Clobetasol propionato 0'05% + Minoxidilo 4-5%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Queratolítico (hiperqueratosis)	Gel tópico de Ácido Salicílico 10-20%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Hiperqueratosis palmar, dermatosis secas con grietas	Gel tópico de Ácido Salicílico 2-5% + Triamcinolona acetónido 0'1% + Urea 5-15%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Hiperqueratosis plantar	Gel tópico de Ácido Salicílico 1-6% + Urea 10-20%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día

Sabañones, escaras, úlceras,...	Gel tópico de Ácido Tánico 5-10% + Alantoína 0'5% + $\beta$ -Escina 1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Escaras, úlceras,...	Gel tópico de Acido Tánico 5% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/días (en cada cura)
Acné	Gel tópico de Benzoilo peróxido 5-10% + Eritromicina 2-4%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
	Gel tópico de Benzoilo peróxido 5-10% + Clindamicina*HCl 1%, csp. 100 gramos	1 vez al día por la tarde o noche
Acné inflamatorio	Gel tópico de Benzoilo peróxido 5% + Clindamicina*HCl 1% + Clotrimazol 1% + Indometazina 2%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Lengua negra vellosa	Gel tópico de Clotrimazol 1% + Urea 40%, csp. 100 gramos	Cepillarse la lengua con el gel y la auda de un cepillo de dientes durante 1-2 minutos y después rascar la lengua con una cucharilla
Herpes (labial y zóster)	Gel tópico de Cobre sulfato 0'1-0'3% + Zinc sulfato 0'1-0'3%, csp. 20 gramos	2-4 aplicaciones/día
- Fisuras anales (tto. del dolor y cicatrización)  - Tratamiento de heridas	Gel tópico de Diltiazem*HCl 2%, csp. 100 gramos	- 2-3 aplicaciones/día. Lavar antes la zona con un jabón suave y agua tibia  - Se aplica sobre la piel circundante a la herida.
Rosácea papulopustular	Gel tópico de Eritromicina 2% + Hidrocortisona 0'5% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Cicatrización de herias sobreinfectadas por anaerobios	Gel tópico de Fenitoína 1% + Lidocaína base 2% + Metronidazol 2%+ Misoprostol 0'024%, csp. 100 gramos	1 aplicación en cada cura previa limpieza de la herida
Rosácea asociada a dermatitis seborreica	Gel tópico de Hidrocortisona 1% + Ketoconazol 2% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Vitíligo	Gel tópico de Kelina al 2%, csp. 100 gramos	Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA
Acné inflamatorio	Gel tópico de Niacinamida 4%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Fisura anal	Gel tópico de Nifedipino al 0'2%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Úlceras dérmicas	Gel tópico de Nifedipino al 16%, csp. 100 gramos	1 aplicación/día
Acné	Gel tópico de Peróxido de Benzoilo 5-10%, csp. 100 gramos	1 aplicación/noche durante 2 semanas; Después (si se tolera), 1 aplicación/12 horas
Reabsorción de bultos de grasa en las mamas. Tensión premenstrual	Gel tópico de Progesterona 1-10%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Foliculitis de zonas pilosas	Gel tópico de Sodio Fusidato al 2-4%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día
Criptorquidia. Micropene infantil.	Gel tópico genital de Testosterona 2%, csp. 100 gramos	
Otitis	Gotas óticas de Ácido Acético glacial 1%, csp. 50 mL	3-5 gotas/8 horas

Eliminación del tapón de cerumen de los oídos	Gotas óticas de Sodio Bicarbonato al 10%, csp. 50 mL	
Otomycosis con componente inflamatorio	Gotas óticas de Betametasona dipropionato 0'05% + Clotrimazol 1%, csp. 50 mL	3-5 gotas/12 horas
Otomycosis	Gotas óticas de Clotrimazol al 1% (ó Ketoconazol 2%), csp. 50 mL	3-5 gotas/12 horas
Dolor de oídos sin patología infecciosa	Gotas óticas de Lidocaína*HCl al 0'5%, csp. 50 mL	2-3 gotas/6 horas
Candidiasis ótica	Gotas óticas de Nistatina 3.000.000 UI, 30 mL	4-5 gotas/12 horas
Otitis externa	Gotas óticas de Ácido Bórico a saturación, csp. 50 mL	2-5 gotas/8 horas
Otitis	Gotas óticas de Acido Bórico al 2%, csp. 50 mL	5 gotas/8 horas durante 5-7 días
Otitis con componente inflamatorio	Gotas óticas de Ácido Acético medicinal 2% + Hidrocortisona 1%, csp. 50 mL	3-5 gotas/8 horas.
Otitis	Gotas óticas de Ciprofloxacino*HCl 2%, csp. 50 mL	3-5 gotas/12 horas
Otitis sin componentes infecciosos	Gotas óticas de Triamcinolona acetónido al 0'1%, csp. 50 mL	2-3 gotas/8 horas
- Quiste hidátidico. - Helmintiasis	Jarabe al 50% de Mebendazol al 3%, csp. 100 mL	- Según peso corporal - 100 mg (3'3 ml)/12 horas/3 días
Antidepresivo. Bulimia. Enuresis nocturna. Neuralgias.	Jarabe de Amitriptilina*HCl, 25 mg/mL, csp. 50 mL	
Inmunosupresor en pediatría	Jarabe de Azatioprina, 10 mg/mL, csp. 30 mL	
En pediatría: glaucoma, epilepsia, diurético.	Jarabe de Azetazolamida, 25 mg/mL, csp. 100 mL	
Corticosteoride para pediatría	Jarabe de Dexametasona 1 mg/mL, csp. 100 mL ..... Jarabe de Prednisona, 5 mg/mL, csp. 100 mL	
Diurético de asa para pediatría	Jarabe de Furosemida 2 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría	Jarabe de Hidrato de Cloral, 100 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría (hipotiroidismo congénito)	Jarabe de L-Tiroxina, 26,67 mcg/mL, csp. 75 mL	0-6 meses --> 25-50 mcg/día 6-12 meses --> 50-75 mcg/día 1-5 años --> 75-100 mcg/día 6-12 años --> 100-150 mcg/día
Pediatría: Sedante. Hipnótico. Pre-anestesia	Jarabe de Midazolam, 5 mg/mL, csp. 50 mL	
Pediatría (β-Bloqueante: HTA. Angina de pecho. Antiarrítmico)	Jarabe de Propranolol 1 mg/mL, csp. 100 mL ..... Solución oral de Propranolol, 1 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría: Anti-H <sub>2</sub>	Jarabe de Ranitidina 15 mg/mL, csp. 30 mL	

Pediatría: Antituberculoso	Jarabe de Rifampicina, 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Micosis cutanea	Loción O/S de Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos	
Síndrome de 'Darier'	Loción O/W de Acido Retinoico 0'1% + Indometacina 3%, csp. 100 gramos	Aplicar por la noche durante 30 min.; después lavar con agua la zona. Ir aumentando progresivamente el tiempo de aplicación hasta tolerarla toda la noche.
Acné	Loción O/W de Acido Retinoico 0'05- 0'15% + Nicotinamida 4% + Zinc acetato 1'2%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Hiperqueratosis asociada a prurito	Loción O/W de Acido Salicílico 2-4% + Mentol 1% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Pediculicida	Loción O/W de Dimeticona al 4%, csp. 100 gramos	Aplicar sobre el cabello y dejarlo durante 12 h y posteriormente lavar
Vitíligo	Loción O/W de Kelina 3%, csp. 100 gramos	
Sarna	Loción O/W de Permetrina 5%, csp. 100 gramos	
Acné	Loción O/W de Peróxido de Benzoilo 5- 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatosis. Psoriasis	Loción O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Lanolina 6% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Prurito con componente alérgico y/o inflamatorio	Loción O/W de Triamcinolona acetónido 0'1% + Mentol 0'5% + Lanolina 6% + Urea 15%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas dando masaje
Acné (mascarilla)	Mascarilla de Acido Retinoico 0'007% + Clindamicina*HCl 4% + Exto. seco Manzanilla 0'50%, csp. 100 gramos	
Candidiasis del pañal	Pasta tópica de Ketoconazol (al agua) 2%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Dermatitis seborreica asociada a dermatomycosis	Pasta tópica de Ketoconazol 2%+ Tardoak (Lassar) 1%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Liquen plano oral	Pasta tópica oral de Acido Retinoico 0'03%, csp. 30 gramos ..... Pasta tópica oral de Acido Retinoico 0'05% + Clobetasol propionato 0'05% + Clotrimazol 1%, csp. 30 gramos ..... Pasta tópica oral de Clotrimazol 1% + Tracólimus 0'1%, csp. 30 gramos	1 aplicación después de cada comida
Candidiasis oral	Pasta tópica oral de Clobetasol propionato 0'05% + Clotrimazol 1% + Lidocaina*HCl 2%, csp. 30 gramos	3-4 aplicaiones/día
Aftas orales sobreinfectadas por hongos	Pasta tópica oral de Clotrimazol 1% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos	Aplicar en capa fina sobre las lesiones después de comidas

Aftas orales	<p>Pasta tópica oral de Exto. Equinácea 10% + Exto. Hipérico 10%, csp. 30 gramos</p> <p>.....</p> <p>Pasta tópica oral de Lidocaína*HCl 2% + Nistatina 100.000 U/g + Triamcinolona acetónido 0'2%, csp. 30 gramos</p> <p>.....</p> <p>Pasta tópica oral de Lidocaína*HCl 2% + Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos</p> <p>.....</p> <p>Pasta tópica oral de Nistatina 100.000-200.000 UI, csp. 30 gramos</p> <p>.....</p> <p>Pasta tópica oral de Triamcinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos</p>	2-4 aplicaciones/día. Es conveniente secar la úlcera antes de aplicarla
Aftas bucales. Liquen plano erosivo de la mucosa bucal	Pasta tópica oral de Fluocinolona acetónido 0'1%, csp. 30 gramos	Aplicar en capa fina sobre las lesiones después de las comidas
Prurito. Varicela	Polvos de Alcanfor 1g + Mentol 1g + Zinc óxido 25g, csp. 50 gramos	2-4 aplicaciones/día
Polvos desodorantes para pies	<p>Mentol, 1% + Zinc óxido, 20% + Acido Bórico, 20% - Talco, csp. 100 gramos</p> <p>.....</p> <p>Acido Bórico 30% + Zinc Estearato 5% + Bismuto Subnitrito 5% + Mentol 1% + Alumbre (Aluminio y Potasio Sulfato) 10% + Calamina 10% + Talco, csp. 100 gramos</p>	1-2 aplicaciones/día
Inflamaciones y dermatosis cutáneas secas	Pomada anhidra de Aceite de Caléndula 5%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Sequedad labial, queilitis,...	Pomada labial de Aceite de Rosa Mosqueta 20% + Vitamina E 1%, csp. 20 gramos	A demanda
Verrugas, callosidades,....	Pomada anhidra de Acido Salicílico 5-40%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12-48 horas
Úlceras de la piel. Escoriaciones. Ezcemas. Quemaduras, intertrigo	Pomada anhidra de Brea de Hulla (Coaltar) 5-10% + Zinc óxido 10-30%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Infecciones cutáneas por microorganismos sensibles	<p>Pomada anhidra de Cloranfenicol 1% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos</p> <p>.....</p> <p>Pomada anhidra de Cloranfenicol al 1%, csp. 100 gramos</p>	1-2 aplicaciones/día
Queratosis solar y senil, enfermedad de Bowen, epiteloma maligno superficial (simple o múltiple)	<p>Pomada anhidra de 5-Fluorouracilo 5%, csp. 100 gramos</p> <p>.....</p> <p>Pomada de Fluorouracilo 5%, csp. 100 gramos</p>	1 aplicación/día durante 3-4 semanas
Diversas dermatosis	Pomada anhidra de Hidrocortisona base 2%, csp. 100 gramos	2-3 aplicaciones/día

Dermatomicosis	Pomada anhidra de Ketoconazol 2%, csp. 100 gramos	1 aplicación/12 horas
Costras y escoriaciones nasales	Pomada anhidra nasal de Mentol 0'5%, csp. 20 gramos	2-3 aplicaciones/día
Infecciones cutáneas mixtas	Pomada de Aceite Caléndula 10% + Clotrimazol 1% + Ext. C. asiatica 10% + Metronidazol 1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Psoriasis	Pomada de Acido Salicílico 5% + Betametasona dipropionato 0'2% + Urea 10%, csp. 100 gramos	1-2 aplicaciones/día
Dermatosis, grietas en las manos,...	Pomada de Acido Salicílico 1% + Alantoína 0'5% + Ictiol 1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Heridas y úlceras cutáneas	Pomada de Alantoína 0'5% + Ictiol 1%, csp. 100 gramos	1-3 aplicaciones/día
Sinusitis	Solución (vahos) alcohólica de Mentol 4-6%, csp. 100 mL	Hacer vahos 2-3 veces/día con un poco de agua y 15 mL de solución
Apnea en neonatos	Solución oral de Cafeína anhidra 500 mg, csp. 100 mL	
Pediatría (ICC, HTA,...)	Solución oral de Captoprilo 1-2 mg/mL, csp. 100 mL ..... Solución oral de Enalaprilo maleato 4 mg/mL, csp. 25 mL	Según peso corporal
Hemorroides, varices,...	Solución oral de Castaño de Indias 20g + Hamamelis 20g, csp. 100 mL	5 mL (1 g)/8 horas después de comidas. No sobrepasar 5 g/día (aproximadamente 25 mL/día)
Tto paliativo de diversos tumores	Solución oral de Dexametasona fosfato 4 mg/mL, csp. 50 mL	1-16 mg/día
Enfermedades degenerativas hepáticas: cirrosis, hepatitis crónica,...	Solución oral de Fitomenadiona (Vitamina K1) al 1%, csp. 100 mL	
Pediatría	Solución oral de Furosemida 2 mg/mL, csp. 30 mL	
Pediatría (diurético)	Solución oral de Hidralazina 50 mg + Manitol al 5% 4 mL, csp. 50 mL	
Pediatría (tuberculosis)	Solución oral de Isoniazida, 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría (hipotiroidismo congénito)	Solución oral de L-Tiroxina 150 mcg, csp. 1 mL	0-6 meses --> 25-50 mcg/día 6-12 meses --> 50-75 mcg/día 1-5 años --> 75-100 mcg/día 6-12 años --> 100-150 mcg/día
Dolor severo	Solución oral de Morfina*HCl 1 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría (HTA, angina)	Solución oral de Nifedipino 100 mg, csp. 100 mL	

Anemia	Solución oral de Vitamina B12 1 mg/5 mL, csp. 100 mL	5 mL (1 mg)/24 horas
Enf. de Wilson. Acrodermatitis enteropática	Solución oral de Zinc acetato 5 mg/mL, csp. 150 mL	
Pénfigo vulgar	Solución oral oleosa de Ciclosporina al 10%, csp. 50 mL	Enjuagues orales 3 veces al día
Verrugas	Solución tópica de Acido Tricloroacético 25%, csp. 10 mL	1 aplicación cada 2-3 días
Rosácea Eritematotelangiectásica (flushing)	Solución tópica de Agua de Hamamelis 10% + Agua de Laurel cerezo 10% + Agua de Rosas 10%, csp. 100 mL	
Queratolítico (verrugas, callos,...)	Solución tópica de Glutaraldehído 25%, 50 gramos	1 aplicación/día
Hiperhidrosis	Solución tópica de Glutaraldehído (al 25%) 10%, csp. 100 mL	
Molluscum contagiosum	Solución tópica de Potasio hidróxido al 4%, csp. 50 mL	Pincelar la lesión y esperar 1-2 minutos (o lo máximo que se aguante). Después lavar con agua y aplicar povidona yodada. Dos veces al día
Herpes	Solución tópica de Zinc Sulfato 0'5-1%, csp. 50 mL	2-3 aplicaciones/día
Alopecia	Solución tópica de Acido Retinoico 0'010-0'025% + Clobetasol propionato 0'05% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL	1 ml/12 horas dando masaje
Desodorante y antitranspirante para pies	Solución tópica de Acido Salicílico 2-5% + Formol 10-30%, csp. 500 mL	
Sabañones	Solución tópica de Acido Tánico 30%, csp. 50 mL	2-4 aplicaciones/día
Prevención de úlceras por decúbito	Solución tópica de Acido Tánico 5%, csp. 50 mL	1 aplicación/6-8 horas
- Hiperhidrosis axilar, palmar y plantar - Pie de atleta	Solución tópica de Aluminio Clorhidrato al 6-25%, csp. 100 gramos	- 2 aplicac./semana - 2 aplicaciones/día
Condilomas, verrugas, callosidades	Solución tópica de Podofilum peltatum resina al 25%, csp. 20 gramos	1 aplicación sobre la zona afectada. Dejar durante 4-6 horas y después lavar con agua y jabón. Aplicar 2 veces/semana (máx. 4 semanas)
Alopecia	Solución tópica de Difenciprona 0'001-2%, csp. 50 mL	
Vitíligo	Solución tópica de Kelina al 3%, csp. 100 mL	Aplicar 30 minutos antes de la sesión de UVA
Tratamiento y prevención de las grietas del pezón en madres lactantes	Solución tópica de Ácido Tánico al 5%, csp. 100 gramos	Aplicar en el pezón después de la tetada y lavar con agua antes de la siguiente
Psoriasis del cuero cabelludo	Solución tópica de Acido Salicílico 2% + Clobetasol propionato 0'05% + Urea 10%, csp. 100 mL	1-3 aplicaciones/día

Alopecia androgénica	Solución tópica de Dexametasona 2% + Estradiol (17-alfa) 0'025%, csp. 100 mL ..... Solución tópica de Estradiol (17-alfa) 0'025% + Minoxidilo 2-5%, csp. 100 mL	1 aplicación/12 horas
Acné	Solución tópica de Eritromicina al 2 %, csp. 100 mL	1 aplicación/12 horas (mañana y noche)
Foliculitis	Solución tópica de Gentamicina*SO <sub>4</sub> 0'1% + Sodio Fusidato 2-4%, csp. 100 mL	2-3 aplicaciones/día
Dermatitis seborreica	Solución tópica de Hidrocortisona 0'3 % + Ketoconazol 2 %, csp. 100 mL	1 aplicación al día por la noche durante un mes
Dermatitis seborreica del cuero cabelludo	Solución tópica de Ketoconazol 2% + Triamcinolona acetónido 0'05% + Urea 5%, csp. 100 mL	1 aplicación/12 horas
Acné	Solución tópica de Ácido Salicílico 2% + Eritromicina 2 %, csp. 100 mL	1 aplicación/12 horas
Hiperhidrosis	Solución tópica de Clorhidróxido de Aluminio 15%, csp. 100 mL	3-4 aplicaciones/semana
Alopecia	Solución tópica de Diclorisona-21-acetato 0'1% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL ..... Solución tópica de Minoxidilo al 2-5%, csp. 100 mL ..... Solución tópica de Ácido Retinoico 0'01-0'025% + Clobetasol propionato 0'05% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL ..... Solución tópica de Ácido Retinoico 0'01-0'025% + Minoxidilo 5%, csp. 100 mL	1 mL/12 horas dando masaje
Acné	Solución tópica de Eritromicina base 2-4% + Zinc acetato 1'2-2%, csp. 100 mL	1-2 aplicaciones/día
Pediculosis (cabeza y pubis). Repelente de insectos (empapando las mosquiteras)	Solución tópica de Permetrina al 1'5%, csp. 100 mL	1 aplicación sobre el pelo. Lavar a las 8-12 hora
Heridas infectadas	Solución tópica de Gentamicina*SO <sub>4</sub> 0'3% + Aceite de Rosa Mosqueta, csp. 100 mL	1-3 aplicaciones/día
Costra láctea del lactante	Solución tópica de Ácido Salicílico 2-4%, csp. 100 mL	Impregnar un algodón con la solución oleosa y aplicarlo sobre el cuero cabelludo una vez al día 5 minutos antes del baño
Psoriasis del cuero cabelludo	Solución tópica de Ácido Salicílico 5-10% + Clobetasol propionato 0'05%, csp. 100 mL ..... Solución tópica de ácido Salicílico 3% + Urea 3%, csp. 100 mL	Se aplica por la noche sobre el cuero cabelludo; a la mañana siguiente se lava con un champu específico para psoriasis
Pediatría (diurético. Glaucoma)	Suspensión oral de Acetazolamida 20 mg/mL, csp. 50 mL	
Gota	Suspensión oral de Alopurinol, 20 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría (arritmias)	Suspensión oral de Amiodarona, 5 mg/mL, csp. 100 mL	

Pediatría (corticoide)	Suspensión oral de Dexametasona 1 mg/mL, csp. 50 mL ..... Suspensión oral de Hidrocortisona, 1 mg/mL, csp. 100 mL ..... Suspensión oral de Prednisona, 5 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría: Edemas, ICC, HTA, Hiperaldosteronismo primario	Suspensión oral de Espironolactona 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Pediatría (diurético)	Suspensión oral de Hidroclorotiazida 2 mg/mL, csp. 100 mL	Niños > 6 meses: 2 mg/kg/día, dividido cada 12 horas
Pediatría (AINE. Cierre prematuro del ductus arterio-venoso)	Suspensión oral de Indometacina, 2 mg/mL, csp. 100 mL	
Tricomonas. Amebiasis	Suspensión oral de Metronidazol, 10 mg/mL, csp. 100 mL	
Ansiolítico	Suspensión oral de Nitrazepam 0'1%, csp. 100 mL	
Inhibición de la producción de ácido gástrico en pediatría	Suspensión oral de Omeprazol 2 mg/mL, csp. 100 mL	1 mg/Kg/día en 1 ó 2 tomas
Pediatría (tuberculosis)	Suspensión oral de Pirazinamida, 100 mg/mL, csp. 40 mL	
Inmunosupresor	Suspensión oral de Tacrólimus 0'5 mg/mL, csp. 100 mL	0,15 a 0,3 mg/kg/día, dividida cada 12 horas y ajustando la dosis según niveles plasmáticos. Tomar en ayunas
Dermatitis seborreica	Suspensión tópica de Fluocinolona acetónido 0'1% + Zinc piritiona 1%, csp. 100 mL ..... Suspensión tópica oleosa de Aceite de Cade 25% + Aceite de Ricino 25% + Ácido Salicílico 25% + Aceite de Oliva 160 gramos	1 aplicación al acostarse y lavar con agua al día siguiente/5 días  Se aplica por la noche y se retira a la mañana siguiente con champú
Psoriasis	Suspensión tópica de Ácido Retinoico 0'1% + Ácido Salicílico 1% + Betametasona dipropionato 0'5%, csp. 100 mL	1 aplicación/12 horas

**Notas:**

- Crema O/W: Crema de rápida absorción que se elimina fácilmente con agua. Adecuada para lesiones húmedas.
- Crema W/O (pomada): Crema grasa que no se elimina con agua. Adecuada para lesiones secas.
- Crema W/S: Crema de base silicónica, desprovista de excipientes grasos. Adecuada para pieles acnéicas, con rosacea.
- Ungüento (pomada anhidra): Excipiente totalmente graso y desprovistos de agua. Adecuado para lesiones muy secas.

- Las cantidades máximas por receta financiadas con cargo al SACyL son
  - :: Preparados tópicos sólidos (cremas, pomadas, gel, pastas,...): 250 gramos
  - :: Preparados orales/tópicos líquidos: 1.000 mL
  - :: Cápsulas: 100 U
  - :: Gotas óticas: 50 mL
  - :: Colirios: 1 envase
  - :: Comprimidos: 100 U
  - :: Granulados: 250 gramos
  - :: Jarabes: 250 mL
  - :: Papeles: 50 U
  - :: Polvos compuestos: 250 gramos
  - :: Pomadas oftálmicas: 1 envase
  - :: Soluciones estériles: 1.000 mL

### **Bibliografía:**

- Monografías Farmacéuticas. COF Alicante. 1998
- Formulación Magistral de Medicamentos. COF de Vizcaya. 2004
- Formulario Farmacéutico, Volumen I. CGCOF. 1995
- La Formulación Magistral en la Dermatología actual. Llambí F, Umbert P. Guidotti Farma (Grupo Menarini). 1998
- Formulario Magistral. COF de Murcia. 1997
- Manual de Fórmulas Magistrales y Normalizadas. Hospital Son Dureta (Serv. Farmacia) de Palma de Mallorca. 1993
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. 3ª Parte Llopis Clavijo Mª J, Baixauli Comes V. Ed. Distribuciones Cid. 1990
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. 2ª Parte Llopis Clavijo Mª J, Baixauli Comes V
- La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia. 1ª Parte Llopis Clavijo Mª J, Baixauli Comes V
- Formulario Nacional. 1ª edición. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2003
- Farmaciagalénica.com, <http://www.farmaciagalénica.com/> . Visitada el 10/04/2007
- CompoundingToday.com, <http://compoundingtoday.com/> . Visitada el 15/04/2007
- Guía Básica para la preparación y administración de medicamentos por vía oral y por vía parenteral®, <http://sefh.interguias.com/basedatos.privada/> . Visitada el 13/04/2007
- Formulación en Farmacia Pediátrica, <http://www.manuelaatienza.info> . Visitada el 12/04/2007
- El Farmacéutico. Revisión hasta abril de 2007.
- Offarm. Revisión hasta abril de 2007.
- Farmacia Profesional. Revisión hasta abril de 2007.
- PAM. Revisión hasta abril de 2007.
- Monografías Galénicas. Lab. Glaxo. 1993