

2 Meses

1º Vacuna hexavalente
Muslo izquierdo



2º Vacuna neumococo
Muslo derecho



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo

Hepatitis B: PAUTA 0-2-4 y 11 meses para recién nacidos de madres portadoras de AgHBs (o imposibilidad de conocer cribado en primeras 24 horas de vida) junto con inmunoglobulina en las primeras 24 horas de vida (preferiblemente primeras 12h de vida).

4 Meses

1º Vacuna hexavalente
Muslo izquierdo



2º Vacuna meningococo C
Muslo derecho



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo

3º Vacuna neumococo
Muslo derecho



Cuando se aplican 2 vacunas en la misma extremidad, los lugares de punción deben estar separados, al menos, 2,5 cm entre sí y procurando que el trayecto de las agujas no sea convergente.

11 Meses

1º Vacuna hexavalente
Muslo izquierdo



2º Vacuna neumococo
Muslo derecho



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo

12 Meses

1º Vacuna meningococo ACWY
Muslo derecho



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo

2º Vacuna triple vírica
Muslo izquierdo



Jeringa y vial
(hay que reconstituir)
Vía de administración: SC



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo

15 Meses

1º Vacuna varicela
Muslo derecho



Jeringa y vial
(Hay que reconstituir)
Vía de administración: SC



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo
o Brazo
Zona tricaptal

Se continuará administrando esta vacuna hasta Julio de 2018, a todos los nacidos antes del 31 de Diciembre de 2016.

18 Meses

1º Vacuna pentavalente



Jeringa y vial
(Hay que reconstituir)
Vía de administración: IM



Pierna
Zona anterolateral
externa del muslo

Calendario vacunación infantil de Andalucía 2021

Para notificar sospechas sobre reacciones adversas contacte con el Centro Andaluz de Farmacovigilancia: caf.vhr.sspa@juntadeandalucia.es. En caso de incidentes de seguridad, contacte con el Observatorio para la Seguridad del Paciente de Andalucía: observatoriodeseguridad.acsa@juntadeandalucia.es



3 Años

1ª Vacuna varicela
Brazo izquierdo



Jeringa y vial
(Hay que reconstituir)
Vía de administración: SC



Brazo
Zona tricaptal

2ª Vacuna triple vírica
Brazo derecho



Jeringa y vial
(Hay que reconstituir)
Vía de administración: SC



Brazo
Zona tricaptal

Se recuerda que las dos vacunas previstas a esta edad, deben administrarse a la vez (en lugares anatómicos diferentes). Si no se aplican a la vez, ambas vacunas deben separarse entre sí, al menos, 4 semanas.

6 Años

1ª Vacuna dTpa
Brazo izquierdo



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Brazo
Región deltoidea

12 Años - Niños diestros

Vacuna meningococo ACWY
1ª Visita **Brazo derecho**



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Brazo
Región deltoidea

Vacuna frente a varicela (VVZ)
2ª y 3ª Visita **Brazo izquierdo**



Jeringa y vial
(hay que reconstituir)
Vía de administración: SC



Brazo
Zona tricaptal

- Si no se vacunaron o no pasaron la varicela (2 dosis: 0-1 mes). Si se pusieron una dosis antes y no pasaron la varicela se los pone la segunda dosis. Si se vacunaron con 2 dosis o pasaron la varicela se consideran inmunes.
- Puede administrarse la vacuna del meningococo C y la de la varicela, el mismo día en lugares anatómicos diferentes.

12 Años - Niñas diestras

1ª Vacuna meningococo ACWY
1ª Visita **Brazo derecho**



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Brazo
Región deltoidea

2ª Vacuna VPH
1ª Visita **Brazo izquierdo**



2 dosis (0-6m)
Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Brazo
Región deltoidea

- **Dos dosis (0-6 m).** Aquellas niñas de 14 años que no hayan sido vacunadas recibirán tres dosis (0-2-6 m)
- Aunque en ficha técnica no figura, existen documentos que avalan la administración simultánea de vacunas de VPH (Gardasil) y meningococo C.

Vacuna frente a varicela (VVZ)
2ª y 3ª Visita **Brazo izquierdo**



Jeringa y vial
(hay que reconstituir)
Vía de administración: SC



Brazo
Zona tricaptal

- Si no se vacunaron o no pasaron la varicela (2 dosis: 0-1 mes). Si se pusieron una dosis antes y no pasaron la varicela se los pone la segunda dosis. Si se vacunaron con 2 dosis o pasaron la varicela se consideran inmunes.
- Como no se tienen estudios de la administración simultánea de vacunas de VPH (Gardasil) y varicela, se recomienda no administrarlas el mismo día, dejando un intervalo entre ambas de 30 días

Vacuna VPH
4ª Visita **Brazo izquierdo**



2 dosis (0-6m)
Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Brazo
Región deltoidea

- **Dos dosis (0-6 m).** Aquellas niñas de 14 años que no hayan sido vacunadas recibirán tres dosis (0-2-6 m)

14 Años

1ª Vacuna tétanos y Difteria
Brazo izquierdo



Jeringa precargada
Vía de administración: IM



Brazo
Región deltoidea